



Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert.

#### 4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a készítmény is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Az oktenidin-dihidrokloridot és fenoxi-etanol tartalmazó készítménynél a következő mellékhatásokat figyelték meg:

Ritka mellékhatások (1000 beteg közül legfeljebb 1-et érinthet):  
Égető érzés, vörösödés, viszketés és meleg érzet a kezelt területeken.

Nagyon ritka mellékhatások (10 000 beteg közül legfeljebb 1-et érinthet):  
Kontakt allergiás reakció.

#### Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti a következő címre:  
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet  
Postafiók 450  
H-1372 Budapest  
Honlap: [www.ogyei.gov.hu](http://www.ogyei.gov.hu)  
A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

#### 5. Hogyan kell tárolni az Octicide készítményt?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik. Legfeljebb 30 °C-on tárolandó. A gyógyszer az első felnyitása után 12 hónapon belül felhasználható, a lejárati időn túl azonban nem. Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe, vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

#### 6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

##### Mit tartalmaz a(z) Octicide?

A készítmény hatóanyaga oktenidin-dihidroklorid és fenoxietanol. 1 mg oktenidin-dihidrokloridot és 20 mg fenoxi-etanol tartalmaz a külsőleges oldatos spray grammonként. Egyéb összetevők: 38%-os kokamidopropil-betaín oldat (kokamidopropil-betaínt, kókuszszírsavat, glicerint, vizet, nátrium-kloridot tartalmaz), nátrium-glükonát, 85%-os glicerin, 10%-os nátrium-hidroxid-oldat, tisztított víz.

##### Milyen az Octicide külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

A(z) Octicide szinte teljesen áttetsző és színtelen oldat fehér polietilén (HDPE) tartályban, polietilénből (LDPE) és polipropilénből (PP) készült fehér kézi permetező pumpával. A doboz 50 ml vagy 250 ml külsőleges oldatot tartalmaz. A kiszerezés mérete 50 ml és 250 ml. Nem feltétlenül kerül mindegyik kiszerezés kereskedelmi forgalomba.

##### A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Neofyt, spol. s r. o.  
Pražská 442  
281 67 Stříbrná Skalice  
Cseh Köztársaság

##### Gyártó:

PROFARMA-PRODUKT, s. r. o.  
Liberecká 801/20  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Csehország

##### Ezt a gyógyszert az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban az alábbi neven engedélyezték:

Tagállam	A készítmény neve
Csehország	Octicide
Magyarország	Octicide
Románia	Octicide
Észtország	Octicide
Szlovákia	Octicide
Lengyelország	Help4Skin SEPTI-SPRAY

OGYI-T-23809/01 1x50 ml polietilén (HDPE) tartályban  
OGYI-T-23809/02 1x250 ml polietilén (HDPE) tartályban

**A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2022. október**

### Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

A gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtak, vagy kezelőorvosa, gyógyszerésze vagy a gondozását végző egészségügyi szakember által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 14 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

#### A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer az Octicide 1 mg/g+20 mg/g külsőleges oldatos spray (továbbiakban Octicide) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Octicide alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az Octicide-t?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell tárolni az Octicide-t?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

#### 1. Milyen típusú gyógyszer az Octicide és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az Octicide fertőtlenítő (antiszeptikus) oldat helyi alkalmazásra. Rövid ideig ismételt alkalmazható a baktériumok és gombák elpusztítására, így a nyálkahártyák és a szomszédos bőrfelületek előkészítésére szolgál a nemi szerveket (hüvely, szeméremajkak, pénisz) érintő diagnosztikai beavatkozások és húgyhólyag-katéter bevezetése előtt, valamint kisebb felszíni sebek ismételt, rövid távú fertőtlenítő (antiszeptikus) kezelése esetén. Az Octicide készítményt legfeljebb 14 napig alkalmazza.

#### Orvosi előírás nélküli felhasználás:

Az Octicide orvossal történő előzetes konzultáció nélkül alkalmazható gyermekek, serdülők és felnőttek kisebb felszíni sebeinek (például horzsolás, karcolás, apró vágások, égési sérülések és rovarcsípések) fertőtlenítő (antiszeptikus) kezelésére.

#### Orvosi ajánlásra történő felhasználás:

Égési sérülések rövid ideig tartó, ismételt kezelésére, valamint a hüvely- és szeméremajkak fertőtlenítő mosásához, illetve a pénisz fertőtlenítéséhez.

#### Orvosi felhasználás:

A nyálkahártya és a szomszédos bőrfelületek előkezelése a külső a nemi szerveket (hüvely, szeméremajkak, pénisz) érintő diagnosztikai vagy műtéti eljárás előtt és húgyhólyag-katéter bevezetése előtt, valamint felszíni sebek ismételt, rövid távú fertőtlenítő (antiszeptikus) kezelése esetén.

#### 2. Tudnivalók az Octicide alkalmazása előtt

##### Ne alkalmazza az Octicide készítményt:

- ha allergiás az oktenidin-dihidrokloridra, a fenoxietanolra vagy a gyógyszer (a 6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére. A készítmény szembe nem kerülhet.

##### Orvos általi felhasználás:

- Az Octicide nem alkalmazható a hasüregben (például műtét közben) vagy a húgyhólyagban, valamint nem alkalmazható a dobhártyán (a középfül membránján, amely a hanghullámokra reagálva rezeg).

##### Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Az Octicide alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával, gyógyszerészével vagy a gondozását végző egészségügyi szakemberrel.
- Az Octicide nem juthat be a véráramba, például véletlenszerű szúrás miatt.
- Ne lélegezze be a készítményt alkalmazás közben kiáramló permetet.
- Az Octicide készítményt körültekintően kell alkalmazni újszülötteknél, különösen koraszülött gyermekeknél. Az Octicide súlyos bőrkárosodást okozhat. Távolítsa el a felesleges készítményt és gondoskodjon róla, hogy az oldat a szükségesnél hosszabb ideig ne maradjon a bőrön (beleértve a készítmény cseppjeit tartalmazó anyagokat – például kötszereket is, – amely közvetlenül érintkeznek a beteggel).
- Az Octicide alkalmazása kerülendő a szem környékén. Ha a szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel.
- Az Octicide okkluzív kötással együtt is alkalmazható.
- Kerülje az anionos felületaktív anyagokkal, például mosószerekkel és tisztítószerekkel való érintkezést, mivel hatástalanná tehetik az aktív oktenidin-hidroklorid hatóanyagot.

#### Egyéb gyógyszerek és az Octicide

Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett vagy alkalmazott,

valamint szedni tervezett vagy alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Az Octicide készítményt ne alkalmazza együtt más vegyületekkel, különösen povidon-jód komplex (PVP-jód) alapú fertőtlenítőszerrel (antiszeptikumokkal), mivel a környező bőrfelületeken sötétbarna vagy lila színű elszíneződések léphetnek fel.

#### Terhesség, szoptatás és termékenység

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

##### Terhesség

Az Octicide alkalmazása elővigyázatosságból kerülendő terhesség ideje alatt. A terhesség 3. hónapja után az Octicide készítmény szükség esetén alkalmazható, amennyiben alkalmazását kezelőorvosa javasolta.

##### Szoptatás

Nincs tapasztalat az Octicide szoptatás alatt történő alkalmazásával kapcsolatban. Az Octicide nem alkalmazható szoptató anyák mellén. Csak akkor alkalmazza a készítményt, ha orvosa egyértelműen javasolta.

##### Termékenység

Az Octicide emberi termékenységre gyakorolt hatását nem vizsgálták.

#### A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Az Octicide nem, vagy csak kis mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

#### 3. Hogyan kell alkalmazni az Octicide készítményt?

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa, gyógyszerésze vagy a gondozását végző egészségügyi szakember által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. Az Octicide alkalmazása higítatlan formában javasolt. A legjobb eredmény elérése érdekében azonnal a sérülés után vagy a gyulladás első jeleit követően alkalmazza az Octicide készítményt.

Sebek kezelése esetén vigye fel az Octicide készítményt az érintett területre naponta egyszer, legfeljebb 14 napig, hacsak kezelőorvosa más ajánlást nem tesz. Az Octicide készítmény felvitelét a mechanikus szűrőfejtől többszöri lenyomásával kell elvégezni. A felszíni sebeket általában nem szükséges kötéssel vagy tapasszal lefedni. A jövőbeni sebfejtőzések megelőzése érdekében ajánlott a sebet a kötéssel lefedni. Mindenesetre, a készítmény alkalmazása után várjon legalább 1–2 percet, mielőtt tovább folytatná a seb kezelését. Kövesse pontosan az utasításokat a kívánt hatás elérése érdekében. Az Octicide maximális hatása az alkalmazásától számított 2 órán belül biztosított. Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét abban az esetben, ha a seb nem gyógyul megfelelően, vagy gyulladás jeleit tapasztalja (bőrpír, égő érzés vagy ödéma). Ne alkalmazza ezt a gyógyszert 14 napnál tovább, anélkül, hogy orvosával megbeszélne. Jelenleg kevés a tapasztalat a 14 napnál hosszabb ideig tartó folyamatos alkalmazásról, ezért az Octicide készítményt ennél hosszabb kezelési időtartamig nem szabad alkalmazni.

#### Alkalmazása gyermekeknél és serdülőknél

Az Octicide adagolása megegyezik, mint a felnőtteknél és a gyermekeknél.

#### Ha az előírtnál több Octicide készítményt alkalmazott

Túladagolást nem jelentettek. A túladagolás azonban nagyon valószínűtlen, ha a készítményt külsőleg alkalmazza. Ha további kérdése van a készítmény használatával kapcsolatban, forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez vagy a gondozását végző egészségügyi szakemberhez.

#### Ha elfelejtette alkalmazni az Octicide készítményt

Ne alkalmazzon dupla adagot az elfelejtett adag pótlására.

**Octicide 1 mg/g + 20 mg/g spray cutanat, soluție**

diclorhidrat de octenidină / fenoxietanol



Următoarele reacții adverse au fost observate la produsul care conține dihidroclorură de octenidină și fenoxietanol:

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane):  
Senație de arsură, roșeață, mâncărime, senzație de căldură.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 de persoane):  
Reacții alergice de contact.

**Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România  
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1  
București 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259  
Fax: +4 0213 163 497  
e-mail: adr@anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

**5. Cum se păstrează Octicide**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.  
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.  
A nu se păstra la temperaturi peste 30 °C.  
După prima deschidere, Octicide trebuie utilizat în termen de 12 luni, dar nu după data de expirare.  
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

**6. Conținutul ambalajului și alte informații****Ce conține Octicide**

Substanțele active sunt diclorhidratul de octenidină și fenoxietanolul. Un gram de spray cutanat, soluție conține 1 mg diclorhidrat de octenidină și 20 mg de fenoxietanol.  
Celelalte componente sunt: cocamidopropil betaină soluție 38% (conține cocamidopropil betaină, acid gras din nucă de cocos, glicerină, apă, clorură de sodiu), gluconat de sodiu, glicerol 85%, soluție de hidroxid de sodiu 10%, apă purificată.

**Cum arată Octicide și conținutul ambalajului**

Octicide este o soluție limpede slab opalescentă, aproape incoloră, disponibilă într-un flacon alb din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) prevăzut cu o pompă albă manuală din polietilenă de densitate mică (LDPE) și polipropilenă (PP), ambalat într-o cutie pliabilă care conține 50 ml sau 250 ml soluție cutanată. Dimensiunile ambalajului sunt de 50 ml și 250 ml. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

**Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul****Deținătorul autorizației de punere pe piață:**

Neofyt, spol. s r. o.  
Pražská 442  
281 67 Stříbrná Skalice  
Cehia

**Fabricantul:**

PROFARMA-PRODUKT, s. r. o.  
Liberecká 801/20  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Cehia

**Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European, sub următoarele denumiri comerciale:**

Stat Membru	Denumire medicament
Republica Cehă	Octicide
Ungaria	Octicide
România	Octicide
Estonia	Octicide
Slovacia	Octicide
Polonia	Help4Skin SEPTI-SPRAY

**Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2022.**



8 594071 270551

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este Octicide și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Octicide
3. Cum să utilizați Octicide
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Octicide
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Octicide și pentru ce se utilizează**

Octicide este o soluție antiseptică (cu efect dezinfectant) pentru utilizare locală.

Se aplică pe membranele mucoase și țesuturile învecinate înainte de procedurile de diagnostic în regiunea anogenitală, inclusiv vaginul, vulva și glandul penisului, precum și înainte de cateterizarea vezicii urinare, pentru tratamentul antiseptic repetat, de scurtă durată, pentru a distruge bacteriile și ciupercile și de asemenea, pentru tratament antiseptic repetat de scurtă durată al rănilor superficiale mici. Nu utilizați Octicide mai mult de 14 zile.

**Utilizare fără recomandarea unui medic:**

Octicide poate fi utilizat fără consultarea prealabilă a unui medic pentru tratamentul antiseptic al rănilor superficiale mici la adulți, adolescenți și copii (cum sunt: abraziuni, zgârieturi, tăieturi / arsuri minore și pentru mușcăturile de insecte).

**Utilizare conform recomandărilor medicului:**

Tratamentul antiseptic temporar repetat al arsurilor, spălarea antiseptică a vaginului și a colului uterin și dezinfectarea penisului.

**Utilizare medicală:**

Tratamentul antiseptic al membranelor mucoase și al zonelor adiacente înaintea procedurilor de diagnostic sau chirurgicale în regiunea anogenitală, inclusiv vaginul, vulva și glandul penisului, precum și înainte de cateterizarea vezicii urinare și pentru tratamentul antiseptic repetat de scurtă durată al rănilor.

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați Octicide****Nu luați Octicide:**

- dacă sunteți alergic la diclorhidrat de octenidină, fenoxietanol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerată la pct. 6). Octicide nu trebuie aplicat în ochi.

**Pentru medici:**

- Octicide nu trebuie utilizat pentru clătirea cavității abdominale (de exemplu intra-operator) sau a vezicii urinare și nu trebuie aplicat pe timpan (o membrană a urechii medii care vibrează ca răspuns la undele sonore).

**Atenționări și precauții**

- Înainte să utilizați Octicide, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Nu permiteți ca Octicide să treacă în circulația sângelui, de ex. ca urmare a injectării accidentale.
- Nu inhalați în timp ce pulverizați pentru a evita pulverizarea în gât.
- Octicide trebuie utilizat cu precauție la nou-născuți, în special la cei născuți prematur. Octicide poate provoca leziuni grave ale pielii. Îndepărtați produsul în exces și asigurați-vă că soluția nu rămâne pe piele mai mult decât este necesar (inclusiv pe materialele cu picături de soluție în contact direct cu pacientul).
- Utilizarea Octicide în ochi trebuie evitată. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă.
- Octicide poate fi utilizat în același timp cu tratamentul ocluziv al plăgii.
- Evitați orice contact cu agenți tensioactivi anionici, de ex. detergenți și produse de curățenie, deoarece pot reduce sau anula acțiunea substanței active clorhidrat de octenidină.

**Octicide împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat, recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Nu amestecați Octicide cu alți compuși, în special nu utilizați Octicide în combinație cu antiseptice pe bază

de iod PVP (complex iod-povidonă) pe zonele învecinate zonei afectate, deoarece pot apărea modificări de culoare de la brun intens până la violet.

**Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

**Sarcina**

Ca măsură de precauție, ar trebui să evitați utilizarea Octicide în timpul sarcinii. Utilizarea Octicide poate fi luată în considerare în timpul sarcinii dacă este recomandată de medicul dumneavoastră, după primele trei luni.

**Alăptarea**

Nu există experiență cu utilizarea Octicide în timpul alăptării. Octicide nu trebuie utilizat în zona sânilor mamelor care alăptează. Nu utilizați Octicide decât dacă este recomandat în mod clar de către medicul dumneavoastră.

**Fertilitatea**

Efectele Octicide asupra fertilității umane nu au fost studiate.

**Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Octicide nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

**3. Cum să utilizați Octicide**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau cu asistenta medicală dacă nu sunteți sigur. Octicide este recomandat pentru utilizare sub formă nediluată. Pentru a asigura cel mai bun efect, aplicați Octicide imediat după producerea leziunii sau la primele semne de inflamație.

Pentru tratamentul rănilor, dacă nu este recomandat altfel de către medic Octicide se aplică o dată pe zi în zona afectată, nu mai mult de 14 zile.

Aplicați Octicide pe zona afectată prin pulverizare repetată cu pulverizatorul mecanic, până la umezirea completă a zonei afectate.

De obicei, nu este necesară nicio acoperire cu pansament sau plasturi a rănilor superficiale. Cu toate acestea, pentru a preveni infectarea ulterioară a plăgii, se recomandă acoperirea plăgii cu pansament. În toate cazurile, trebuie respectat un timp de expunere de cel puțin 1 - 2 minute după aplicare înainte de efectuarea unor proceduri suplimentare. Urmați cu atenție instrucțiunile pentru a obține efectul dorit. Efectul maxim al Octicide este obținut în termen de 2 ore de la aplicare. Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul în cazul în care rana nu este vindecată corect sau prezintă semne de inflamație (roșeață, arsură sau edem). Nu utilizați acest medicament mai mult de 14 zile fără să vă adresați medicului. Până în prezent, este disponibilă o experiență limitată de utilizare continuă timp de maximum 14 zile, prin urmare, Octicide nu trebuie utilizat mai mult decât această perioadă.

**Utilizarea la copii și adolescenți**

Modul de utilizare al Octicide este același la adulți și copii și adolescenți.

**Dacă utilizați mai mult Octicide decât trebuie**

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj. O supradozare cu Octicide după administrarea locală este extrem de puțin probabilă. Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

**Dacă uitați să utilizați Octicide**

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

**4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.